ПОЛУКУСТАРНИЧКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ - ПАРТЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ - CONVOLVULETA HAMADAE

Каримжон Муталов
Чирчикский государственный педагогический институт, Ташкентская область
к.б.н., и.о. доцента, преподователь кафедры биологии
mutalovkarimjon@gmail.com

Бахтиёр Рамазонов
Чирчикский государственный педагогический институт, Ташкентская область
док. фил. по. биол. преподователь кафедры биологии
ramazonov74@mail.ru

Дониёр Закиров
Чирчикский государственный педагогический институт, Ташкентская область
преподователь кафедры биологии
d.zakirov_76@mail.ru

Мавлуда Гулматова
г. Чирчик общеобразовательная школа № 16
преподаватель биологии и химии

АННОТАЦИЯ

В статье даны результаты исследования проводимых в условиях Юго-Западного Кызылкума по изучению растительного покрова, так как растительность региона издавно используется естественной пастбыщей для выпаса овец и верблюдов. С увеличением потребности людей на продукты животноводство, пропорциально требует увеличения поголовья стада. Это в свою очередь диктует расширения площади пастбищ, или же улучщения современного состояния используемых пастбыщ с разными методами современных времен. С этой целью нами проводились геоботанические исследования по изучению современного состояния растительного покрова данного региона. В частности партечниковые пастбища являются сравнительно урожайними до 2.0-3.5 (4.5) ц/га, с проективным покрытием в отдельных участках составляет 30-35%. По этому изучения видовой и возрастной состав, урожайность жизненных форм партечниковых сообществ имеет большое значение животноводстве а, также в изучение воздействие антропогенного фактора на растительности аридных регионов в целом.

Ключевые слова: ассоциация, формация, флористический состав, гемипсаммофит, маломощные пески, пролювиальные шлейфы, останцовые возвышения, хрящевато-щебнистые гипсоносные почвы, бугрыстые, грядовые закрепленные пески, суглинистые гипсоносные серо-бурые почвы.

SEMI-SHRED VEGETATION - PARTEK FORMATION-CONVOLVULETA HAMADAE

Karimjon Mutalov
Chirchik State Pedagogical Institute, Tashkent region
Ph.D., Acting Associate Professor, Lecturer of the Department of Biology
mutalovkarimjon@gmail.com

Bakhtiyor Ramazonov
Chirchik State Pedagogical Institute, Tashkent region
Doc. Phil. Biol. Lecturer of the Department of Biology
ramazonov74@mail.ru

Doniyor Zakirov
Chirchik State Pedagogical Institute, Tashkent region
Lecturer of the Department of Biology
d.zakirov_76@mail.ru

Mavluda Gulmatova
Chirchik secondary school 16
Biology and Chemistry teacher

ABSTRACT

The article presents the results of research carried out in the conditions of Southwest Kyzylkum to study the vegetation cover, since the vegetation of the region has long been used by natural pasture for grazing sheep and camels. With an increase in people's demand for livestock products, it proportionally requires an increase in the herd population. This, in turn, dictates the expansion of the area of pastures, or the improvement of the current state of the used pastures with different methods of modern times. For this purpose, we carried out geobotanical studies to study the current state of the vegetation cover in this region. In particular, partech pastures are relatively productive up to 2.0-3.5 (4.5) c / ha, with a projective cover in some areas of 30-35%. According to this, the study of the species and age composition, the productivity of life forms of greenhouse communities is of great importance to animal husbandry, as well as in the study of the impact of the anthropogenic factor on the vegetation of arid regions in general.

Keywords: association, formation, floristic composition, hemipsammophyte, thin sands, prolyuvial trails, remnant elevations, cartilaginous-gravelly gypsum-bearing soils, hilly, fixed ridge sands, loamy gypsum-bearing gray-brown soils.