УРУҒ МЕВАЛИ БОҒЛАРДАГИ ЎРГИМЧАК КАНАЛАРГА ҚАРШИ АКАРИЦИДЛАРНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

Азимжон Раимқулович Анорбаев
Тошкент давлат аграр университети профессори
azimjon.anorbayev@mail.ru

Аҳлиддин Хабибуллойевич Раҳманов
Тошкент давлат аграр университети докторанти
a.raxmonov@tdau.uz

АННОТАЦИЯ

Мақолада уғмевали боғларда (олма) ўргимчакканаларга (*Tetranychus urticae* Koch) қарши акарицидларнинг самарадорилигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар натижалари келтирилган. Олманинг Семеренко навида ўргимчаккана миқдорини бошқаришда Омайт 57% эм.к. (1,5 л/га) препарати танлаб олинган. Ушбу препаратга андоза сифатида эса Вертимек 1,8 % эм.к. (0,4 л/га) препарати препарати олинган. Тажриба учун олинган препаратлар қўлланилган кундан бошлаб назорат кузатувлар 3 кундан бошлаб, таҳлил қилиб борилган. Кимёвий воситалар қўлланилгандан 7-кунда биологик самарадорилик энг юқори бўлди, яъни 84,5 % ни ташкил эди.

Калит сўзлар: ўргимчаккана зараркунанда уруғмевали боғ тур таркиби.