НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЕМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Азиза Тахировна Джурабекова
Самаркандский государственный медицинский институт

Наргиза Нурмаматовна Абдуллаева
Самаркандский государственный медицинский институт

Саодат Суръатовна Игамова
Самаркандский государственный медицинский институт

АННОТАЦИЯ

По данным различных авторов, частота когнитивных нарушений при черепно-мозговой травме составляет от 37% до 90% в зависимости от степени тяжести травмы. Высокая распространенность черепно-мозговой травмы у лиц трудоспособного возраста обусловливает важность изучения проблемы посттравматических нарушений. Рост частоты инвалидизации молодых людей призывного возраста делает проблему черепно-мозговой травмы не только медицинской, но и медико-социальной клинической практике применяются шкалы, разработанные для диагностики когнитивных нарушений при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и других. Патогенез и клиническая характеристика нарушения когнитивных функций имеют характерные особенности, не всегда позволяющие этим шкалам выявлять имеющиеся нарушения. В то же время среди пациентов с ЧМТ встречается психопатологическая симптоматика в виде астении, повышенной тревожности и депрессии. Многие исследователи считают психопатологическую симптоматику ведущей в клинической картине последствий черепно-мозговой травмы.

Ключевые слова: ЧМТ, сотрясение головного мозга, болезнь Альцгеймера.

NEUROPSYCHOLOGICAL TESTING IN PATIENTS WITH A CONSEQUENCE OF CRANIOCEREBRAL INJURY

Aziza Takhirovna Jurabekova
Samarkand State Medical Institute

Nargiza Nurmamatovna Abdullaeva
Samarkand State Medical Institute

Saodat Suryatovna Igamova
Samarkand State Medical Institute

ABSTRACT

According to various authors, the incidence of cognitive impairment in traumatic brain injury ranges from 37% to 90%, depending on the severity of the injury. The high prevalence of traumatic brain injury in people of working age makes it important to study the problem of post-traumatic disorders. The increase in the incidence of disability among young people of military age makes the problem of traumatic brain injury not only medical, but also medical and social. For screening neuropsychological testing in routine clinical practice, scales developed for the diagnosis of cognitive impairments in neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease and others are used. The pathogenesis and clinical characteristics of cognitive impairment have characteristic features that do not always allow these scales to identify existing impairments. At the same time, psychopathological symptoms in the form of asthenia, increased anxiety and depression are encountered among patients with TBI. Many researchers consider psychopathological symptoms to be the leading one in the clinical picture of the consequences of traumatic brain injury.

Keywords: TBI, concussion, Alzheimer's disease.