ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021
ISSN: 2181-1385
Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89
DOI: 10.24412/2181-1385-2021-7-335-340

РОЛЬ ЭНДОБИЛИАРНОЙ-ЩИПЦОВОЙ БИОПСИИ В ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЯХ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКАХ

Одил Мамасамиевич Турсунов
PhD, гепатоонкохирург торакоабдоминального отделении, Самаркандский филиал Республиканского специализированного центра онкологии и радиологии.
odiltursunov2412@gmail.com

Миржалол Дехканович Джураев
Профессор, Заведующий кафедры онкологии, Самаркандского Государственного Медицинского Института.
Dr.djuraev@list.ru

Азиз Абдумажидович Кулиев
PhD, Ассистент кафедры онкологии, Самаркандского Государственного Медицинского Института.
aziz.kuliev1930@mail.ru

Бустоной Собировна Эсанкулова
Магистрант кафедры онкологии, Самаркандского Государственного Медицинского Института
bsobirovna@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Более поздние исследования показали, что гистологический диагноз с помощью щипцовой биопсии был более успешным, чем цитология желчи или тонкоигольная аспирация с зарегистрированной чувствительностью 78-93%.

Ключевые слова: желтуха, обструктивная, желчевыводящие пути, щипцовая биопсия, игла методы, холангиография.

ABSTRACT

More recent studies have shown that histological diagnosis by forceps biopsy was more successful than bile cytology or fine needle aspiration, with a reported sensitivity of 78-93%.

Keywords: jaundice, obstructive, biliary tract, pincer biopsy, needle methods, cholangiography.